

Cannabidiol (CBD)-Lösung 2,5 % (m/m)

Dieses Präparat enthält kein THC (Tetrahydrocannabinol) und untersteht nicht dem Betäubungsmittelgesetz. Es kann bei Epilepsie mit einem normalen Arztrezept verschrieben werden. Bei anderen Indikationen ist zudem eine schriftliche Dokumentation der Indikation (inkl. Begründung, weshalb ein Therapieversuch mit CBD gestartet wird) notwendig und der Apotheke zuzustellen.

Packungsgrössen/Preise

Aponorm-Fläschchen, braun (mit normiertem Tropfeinsatz)

20 g (entsprechen 500 mg CBD)	Fr. 80.00	1 mg kostet ca. Fr. -.16
50 g (entsprechen 1250 mg CBD)	Fr. 200.00	1 mg kostet ca. Fr. -.16

Tagestherapiekosten

Tagesdosis 10 mg	Fr. 1.60
Tagesdosis 25 mg	Fr. 4.00
Tagesdosis 50 mg	Fr. 8.00
Tagesdosis 100 mg	Fr. 16.00

36 Tropfen entsprechen ca. 1,0 g CBD-Lösung 2,5 %

720 Tropfen entsprechen ca. 20,0 g CBD-Lösung 2,5 %

1800 Tropfen entsprechen ca. 50,0 g CBD-Lösung 2,5 %

<u>Umrechnungstabelle</u> (Anzahl Tropfen entsprechend mg CBD)		
Bemerkung: spezieller, normierter Tropfeinsatz		
1 Tropfen	entspricht ca.	≈ 0,7 mg CBD
3-4 Tropfen	entsprechen ca.	≈ 2,5 mg CBD
14 Tropfen	entsprechen ca.	≈ 10,0 mg CBD
28 Tropfen	entsprechen ca.	≈ 20,0 mg CBD
36 Tropfen (= 1 g Lösung) entspr.		≈ 25,0 mg CBD
Dosierung in ml: 1 ml (= ca. 1 g = 36 Tropfen) ≈ 25 mg CBD		
Dichte der CBD-Lösung 2,5 %: ca. 0,95 g/cm ³ → d.h. bezüglich Dosiergenauigkeit (mit 1 ml Spritze) ist die Dichte vernachlässigbar		

Dosierung

Die Dosierung ist individuell und wird vom Arzt festgelegt. Der therapeutische Bereich ist enorm gross, in Studien wurden bei Erwachsenen Dosen zwischen 10 mg und 1000 mg CBD pro Tag eingesetzt. Bei Kindern mit Epilepsie wurden in Studien 2–5 mg (bis max. 25 oder 50 mg) CBD/kg Körpergewicht (verteilt auf mehrere Gaben) eingesetzt*.

*Devinsky O. et al. Lancet Neurol. 2016 Mar;15(3):270-8; Hess E. J. et al. Epilepsia 2016 Oct;57(10):1617-24

Einnahme

Die öligen Tropfen werden bevorzugt mit fetthaltiger Nahrung eingenommen (z.B. in wenig Speiseöl, Joghurt, Milch oder auf einen Butterkeks).

Haltbarkeit/Lagerung

Verfalldatum: Ab Herstellungsdatum 6 Monate. Die Lagerung erfolgt bei Zimmertemperatur. Als Trägeröl wird ein Neutralöl (Miglyol 812) verwendet, welches mit dem natürlichen Konservierungsmittel Ascorbylpalmitat (0,05 %) konserviert wird.

Cannabidiol (CBD)-Lösung 5,0 % (m/m)

Dieses Präparat enthält kein THC (Tetrahydrocannabinol) und untersteht nicht dem Betäubungsmittelgesetz. Es kann bei Epilepsie mit einem normalen Arztrezept verschrieben werden. Bei anderen Indikationen ist zudem eine schriftliche Dokumentation der Indikation (inkl. Begründung, weshalb ein Therapieversuch mit CBD gestartet wird) notwendig und der Apotheke zuzustellen.

Packungsgrössen/Preise

Aponorm-Fläschchen, braun (mit normiertem Tropfeinsatz)

20 g (entsprechen 1000 mg CBD)	Fr. 160.00	1 mg kostet ca. Fr. -.16
50 g (entsprechen 2500 mg CBD)	Fr. 380.00	1 mg kostet ca. Fr. -.15

Tagestherapiekosten (bezogen auf 20 g Fläschchen)

Tagesdosis 10 mg	Fr. 1.60
Tagesdosis 25 mg	Fr. 4.00
Tagesdosis 50 mg	Fr. 8.00
Tagesdosis 100 mg	Fr. 16.00

36 Tropfen entsprechen ca. 1,0 g CBD-Lösung 5,0 %

720 Tropfen entsprechen ca. 20,0 g CBD-Lösung 5,0 %

1800 Tropfen entsprechen ca. 50,0 g CBD-Lösung 5,0 %

<u>Umrechnungstabelle</u> (Anzahl Tropfen entsprechend mg CBD)		
Bemerkung: spezieller, normierter Tropfeinsatz		
1 Tropfen	entspricht ca.	≈ 1,4 mg CBD
3-4 Tropfen	entsprechen ca.	≈ 5,0 mg CBD
7 Tropfen	entsprechen ca.	≈ 10,0 mg CBD
18 Tropfen	entsprechen ca.	≈ 25,0 mg CBD
36 Tropfen (= 1 g Lösung) entspr.		≈ 50,0 mg CBD
Dosierung in ml: 1 ml (= ca. 1 g = 36 Tropfen) ≈ 50 mg CBD		
Dichte der CBD-Lösung 5,0 %: ca. 0,95 g/cm ³ → d.h. bezüglich Dosiergenauigkeit (mit 1 ml Spritze) ist die Dichte vernachlässigbar		

Dosierung

Die Dosierung ist individuell und wird vom Arzt festgelegt. Der therapeutische Bereich ist enorm gross, in Studien wurden bei Erwachsenen Dosen zwischen 10 mg und 1000 mg CBD pro Tag eingesetzt. Bei Kindern mit Epilepsie wurden in Studien 2–5 mg (bis max. 25 oder 50 mg) CBD/kg Körpergewicht (verteilt auf mehrere Gaben) eingesetzt*.

*Devinsky O. et al. Lancet Neurol. 2016 Mar;15(3):270-8; Hess E. J. et al. Epilepsia 2016 Oct;57(10):1617-24

Einnahme

Die öligen Tropfen werden bevorzugt mit fetthaltiger Nahrung eingenommen (z.B. in wenig Speiseöl, Joghurt, Milch oder auf einen Butterkeks).

Haltbarkeit/Lagerung

Verfalldatum: Ab Herstellungsdatum 6 Monate. Die Lagerung erfolgt bei Zimmertemperatur. Als Trägeröl wird ein Neutralöl (Miglyol 812) verwendet, welches mit dem natürlichen Konservierungsmittel Ascorbylpalmitat (0,05 %) konserviert wird.

Cannabidiol (CBD)-Lösung 10,0 % (m/m)

Dieses Präparat enthält kein THC (Tetrahydrocannabinol) und untersteht nicht dem Betäubungsmittelgesetz. Es kann bei Epilepsie mit einem normalen Arztrezept verschrieben werden. Bei anderen Indikationen ist zudem eine schriftliche Dokumentation der Indikation (inkl. Begründung, weshalb ein Therapieversuch mit CBD gestartet wird) notwendig und der Apotheke zuzustellen.

Packungsgrössen/Preise

Aponorm-Fläschchen, braun (mit normiertem Tropfeinsatz)

10 g (entsprechen 1000 mg CBD)	Fr. 160.00	1 mg kostet ca. Fr. -.16
20 g (entsprechen 2000 mg CBD)	Fr. 320.00	1 mg kostet ca. Fr. -.16
50 g (entsprechen 5000 mg CBD)	Fr. 720.00	1 mg kostet ca. Fr. -.15

Tagestherapiekosten (bezogen auf 20 g Fläschchen)

Tagesdosis 10 mg	Fr. 1.60
Tagesdosis 25 mg	Fr. 4.00
Tagesdosis 50 mg	Fr. 8.00
Tagesdosis 100 mg	Fr. 16.00

36 Tropfen entsprechen ca. 1,0 g CBD-Lösung 10,0 %

720 Tropfen entsprechen ca. 20,0 g CBD-Lösung 10,0 %

1800 Tropfen entsprechen ca. 50,0 g CBD-Lösung 10,0 %

<u>Umrechnungstabelle</u> (Anzahl Tropfen entsprechend mg CBD)		
Bemerkung: spezieller, normierter Tropfeinsatz		
1 Tropfen	entspricht ca.	≈ 2,8 mg CBD
3-4 Tropfen	entsprechen ca.	≈ 10,0 mg CBD
9 Tropfen	entsprechen ca.	≈ 25,0 mg CBD
18 Tropfen	entsprechen ca.	≈ 50,0 mg CBD
36 Tropfen (= 1 g Lösung) entspr.		≈ 100,0 mg CBD
Dosierung in ml: 1 ml (= ca. 1 g = 36 Tropfen) ≈ 100 mg CBD		
Dichte der CBD-Lösung 10,0 %: zirka 0,95 g/cm ³ → d.h. bezüglich Dosiergenauigkeit (mit 1 ml Spritze) ist die Dichte vernachlässigbar		

Dosierung

Die Dosierung ist individuell und wird vom Arzt festgelegt. Der therapeutische Bereich ist enorm gross, in Studien wurden bei Erwachsenen Dosen zwischen 10 mg und 1000 mg CBD pro Tag eingesetzt. Bei Kindern mit Epilepsie wurden in Studien 2–5 mg (bis max. 25 oder 50 mg) CBD/kg Körpergewicht (verteilt auf mehrere Gaben) eingesetzt*.

*Devinsky O. et al. Lancet Neurol. 2016 Mar;15(3):270-8; Hess E. J. et al. Epilepsia 2016 Oct;57(10):1617-24

Einnahme

Die öligen Tropfen werden bevorzugt mit fetthaltiger Nahrung eingenommen (z.B. in wenig Speiseöl, Joghurt, Milch oder auf einen Butterkeks).

Haltbarkeit/Lagerung

Verfalldatum: Ab Herstellungsdatum 6 Monate. Die Lagerung erfolgt bei Zimmertemperatur. Als Trägeröl wird ein Neutralöl (Miglyol 812) verwendet, welches mit dem natürlichen Konservierungsmittel Ascorbylpalmitat (0,05 %) konserviert wird.

Bahnhof Apotheke Langnau AG / Abteilung Cannabis-med / Dorfstrasse 2 / 3550 Langnau i.E.
Tel. 034 402 12 55 (nach Bandansage Taste 2 drücken) / Fax 034 402 25 35
Email: fankhauser@cannabis-med.ch / Homepage: www.panakeia.ch